

Minder bekende Eetbare Zwammen.

zwartachtige schubbetjes die evenwel kunnen ontbreken daar veelvuldige regens ze afspoelen. De okerkleurige steel is veel langer dan de hoed breed is, bereikt dikwijls een lengte van 20 cM., is gevuld, vezelig, taai, van onderen iets dikker en bovenaan gestreept.

De witte, stevige en duurzame ring bevindt zich vlak onder de plaatjes die iets langs den steel afloopen, eerst wit, later vleeschkleurig en soms roodachtig gevlekt zijn. De zure, scherpe smaak van het vleesch verdwijnt door de toebereiding, zoodat het door velen gegeten wordt.

Aan den voet van boomstammen, stronken, en op wortels is deze zwam, die hoogst schadelijk is voor de boscultuur, vooral in September overal te vinden. Zij groeien dicht op elkaar en door de vallende sporen der hooger staande, zien de daar ondergroeiende er bepoederd uit.

Tricholoma nudum trekt door zijn bruinachtig-violetkleurigen hoed waartegen de aanvankelijk violetkleurige, dicht op-

een staande plaatjes prachtig uitkomen, veler aandacht. Hij bereikt een grootte van 10 cM., is glad en vochtig met dunnen omgebogen rand. De steel is eenkleurig met den hoed, stevig, gevuld, van boven meelachtig bestoven en onderaan iets gezwollen. De ring ontbreekt.

Het licht violette vleesch is zacht van smaak en riekt naar vruchten.

Zij is gedurende het najaar, vooral in naaldbossen door het geheele land te vinden. Een aanverwante soort „*personatum*” die tot 15 cM. groot wordt en ook in andere bosschen, in tuinen en op grazige plekken langs wegen te vinden is, wordt eveneens gegeten.

Tricholoma equestre is evenzeer een mooi gebouwde paddenstoel met een gelen, middenin bruin getinten hoed die gewoonlijk 10 cM. breed is.

De breede, goudgele plaatjes staan dicht opeen, zijn bij den steel afgerond en scherp aan den rand. De steel zonder ring is onderaan iets dunner, gevuld, iets lichter van kleur dan de hoed, glad, fijn geschubd en 4 à 6 cM. lang. Het vleesch is geelwit en sappig. Zij is van Juli tot October in onze naaldbossen te vinden doch komt niet overal voor.

Van het geslacht *Tricholoma* zijn nog verschillende soorten eetbaar maar daar de besten wit zijn en dit misschien verwarring zou kunnen

geven met giftige, achtte ik het beter die niet te bespreken maar ze te laten staan voor hen die meer in de mycologie zijn doorgedrongen.

Clitocybe nebularis is een stevig gebouwde zwam met een donker of licht grijzen hoed die eerst bolrond en later vlak is met een verhooging in het midden; de rand is naar bin-



CLITOCYBE NEBULARIS.

nen omgerold; de breedte wisselt af van 8 à 12 cM. De witachtige plaatjes staan dicht opeen, zijn scherp aan de uiteinden en loopen langs den steel omlaag. De niet beringde steel is gevuld, loopt naar beneden dikker toe en heeft een lengte van 4 à 8 cM. Het witte vleesch dat zelden door insecten aangestoken is, riekt naar meel. Tot laat in den herfst is zij, veelal kringen vormend, onder hakhout op afgevalen bladeren in groot aantal bijeen te vinden.

Clitocybe (Laccaria) laccata. Geen paddenstoel komt onder zooveel vormen en kleuren voor als de hier genoemde, zoodat men dikwijls twijfelt of het niet verschillende zijn. Men vindt ze violet, bruinachtig violet