

Minder bekende Eetbare Zwammen.

groeit van Juli tot October in allerlei bosschen doch het meest in die van naaldhout.

B. flavus bezit eveneens een kleverigen hoed 5 à 14 c.M. en een beringden steel, doch hier is de steel boven den ring van een fijn netwerk voorzien; ook deze soort is in dennenbosschen te vinden maar het liefst onder lariksen gedurende het einde van den zomer tot October.

B. flavidus heeft een geelachtigen, kleverigen, 2 à 5 c.M. breeden hoed, die door een minder dikken steel gedragen wordt; boven de slijmerige ring bevinden zich kleverige, witachtige kliertjes. Zij is van Augustus tot September op vochtige plekken in naaldbosschen algemeen te vinden.

B. granulatus. Haar hoed is 5 à 6 c.M. breed, met een taaie, kleverige massa bedekt en de niet beringde steel bovenaan met korreltjes bedekt. De poriënlaag laat veelal een melkachtig vocht vloeien, dat opgedroogd zijnde kleine korreltjes vormt. In naaldbosschen, op zandigen bodem, van Juni tot October, eenzaam of in troepen te vinden en vrij algemeen voorkomend.

B. badius bezit geen ring; de hoed is 5 à 15 c.M. breed, de veelal gebogen steel is bruinachtig bepoederd, de poriënlaag krijgt door drukking groene plekken. Het vleesch kleurt zich een weinig blauw boven de buisjeslaag wanneer het gebroken wordt. Van Juli tot October in zandige streken algemeen in naaldbosschen te vinden.

B. bovinus heeft een lichtbruin-roestkleurigen hoed, die 5 à 9 c.M. breed, in drogen tijd glimmend en bij vochtig weêr kleverig kan zijn; hij heeft de eigenschap van zeer buigzaam te zijn. De rand is golvend. De steel is eenkleurig met den hoed maar onder-

aan een weinig rood getint. In naaldbosschen vrij algemeen in troepen voorkomend.

B. scaber is van alle Boleti onmiddellijk te onderscheiden door haar vrij langen, grijzen, niet buikigen steel, die vlokkig en geschubd is. De 5 à 12 c.M. breede hoed kan ook aschgrauw voorkomen en is dikwijls met vezeltjes bedekt. Het zachte, witte vleesch kleurt zich iets zwartachtig door de lucht. Van Juli tot October op beschaduwde plekken in allerlei bosschen en daar waar berken groeien zeker te vinden; komt door het geheele land voor en is overal gemeen.

B. versipellis is met zijn roodachtigen of oranjekeurigen 5 à 12 c.M. breeden hoed een zeer mooien paddenstoel; de niet buikige, lange steel is witachtig en met zwarte schubbetjes bedekt. Het vleesch wordt door de lucht eerst violet en dan blauwachtig zwart. Zij komt, meestal in groot aantal, in berkenbosschen voor, doch is niet algemeen.

B. impolitus heeft een niet kleverigen maar vlok-kigen, later korreligen hoed. De steel



BOLETUS EDULIS, EEKHOORTJESBROOD.

is fijn behaard, soms met roodachtigen kring aan den top. Het vleesch is wit geelachtig onder de opperhuid. In zomer en herfst is zij in eiken- en naaldbosschen te vinden doch niet algemeen.

Fistulina hepatica. Geen zwam die meer de aandacht trekt dan deze, en geen wonder, zij gelijkt op een stuk bloederig, rauw vleesch waarom zij dan ook den naam van boombiefstuk en leverzwam gekregen heeft.

Het is een dikke, sappige, vleezige massa van een bloedroode of roodbruine kleur en veelal met wratjes bedekt. Zij bereikt een grootte van 12 tot soms 40 c.M. en is met een korten steel aan stammen van meestal oude boomen, voornamelijk van eiken be-